


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	2
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Translittérations	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	5
5.4. Revues des indications	5
Études cliniques et expérimentales	5
6.1. Pathologies sexuelles	5
7. Références	5

55V Heyang 合阳 [合陽]

prononciation  [55v-heyang.mp3](#)

articles connexes: 54V - 56V - [Méridien Zutaiyang](#)



 WHO 2009.

1. Dénomination

1.1. Traduction

合阳[合陽], Héyáng	Union des Yang (Nguyen Van Nghi 1971) Réunion des <i>Yang</i> (Pan 1993) Réunion (des 2 branches) Yang (Laurent 2000)
-----------------------	---

- Zhou Mei-sheng 1984 : *he* join; meet. *yang* the Meridian of Foot Taiyang.
- *He*: réunion (Pan 1993); (Ricci 1726) : fermer, se fermer, unir, réunir, joindre (Guillaume 1995) ; unir, réunir, associer, appairer, harmonie, concorde... Cf. 4GI *Hegu* (Laurent 2000).
- *Yang* : de *Yin* et *Yang* (Pan 1993); (Ricci 5650) du couple Yin-Yang (Guillaume 1995) ; de Yin/Yang... Cf. 5GI *Yangxi* (Laurent 2000).

1.2. Origine

- *Jia yi jing* (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Heyang* The two separated lines of Foot *Taiyang* Points rejoin at this place.
- Pan 1993 : C'est le point de réunion du méridien *Zutaiyang* Vessie avec sa branche externe ; donc, c'est là où se réunissent les *Yang*.
- Laurent 2000 : ce point est la zone de réunion des 2 branches dorsales du méridien de Vessie (1ère et 2° chaînes). On aurait pu traduire également par "harmonise le *yang*" (le dos), en raison de la symptomatologie du point.

1.4. Noms secondaires

1.5. Translittérations

- Ho-yang (Li Su Huai 1976)

1.6. Code alphanumérique

- VE55, 55V, 55VE (Vessie)
- BL55, B55, Bladder 55 (Bladder)
- UB55 (Urinary bladder)
- VI-C5 (Li Su Huai 1976)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A deux distances au-dessous de Oé Tchong sur la verticale passant par le milieu du creux poplité.
- Roustan 1979 : à deux distances au-dessous de *Wei Zhong* 40V, entre les deux jumeaux.
- Lu HC 1985 : Location-1 : 2 *cuns* below *Weizhong* = B40 (the distance between B40 and *Kunlun* = B60 is divided into 16 *cuns*). Location-2 : 2 *cuns* below *Weizhong* = B40, in between the two heads of gastrocnemius (external and internal femoral condyles of gastrocnemius). How-to-locate-1 : Let the patient bend knees or lie on stomach, locate this point 2 *cuns* directly below *Weizhong* = B40.
- Deng 1993 : Sur la face postérieure de la jambe et sur une ligne reliant *Weizhong* (V40) et *Chengshan* (V57), à 2 *cun* au-dessous de *Weizhong* (V40).
- Pan 1993 : *Heyang* vient après *Zhibian* (54V) ; il se trouve à 2 distances au-dessous du point *Weizhong* (40V).
- Guillaume 1995 : À 2 distances au-dessous de *Weizhong*- 40V.
- Laurent 2000 : sur la face postérieure de la jambe, à 2 *cun* au-dessous de *Weizhong* 40V, sur une ligne reliant *Weizhong* 40V à *Chengshan* 57V.
- WHO 2009 : On the posterior aspect of the leg, between the lateral head and medial head of the gastrocnemius muscle, 2 B-*cun* distal to the popliteal crease. *Note*: 2 B-*cun* distal to BL40, on the line connecting BL40 with BL57.

Items de localisation

- Creux poplité
- 40V, 57V

2.2. Textes classiques

- Jia Yi : A 2 *cun* au-dessous du milieu du creux poplité (Deng 1993).
- Qian Jin : A 3 *cun* au-dessous du milieu du creux poplité (Deng 1993).
- Deng 1993 : tous les ouvrages de médecine estiment que ce point est localisé au-dessous du milieu du creux poplité, là où se trouve *Weizhong* (V40). Quant à la distance qui sépare le point du creux poplité, certains livres indiquent "3 *cun*", d'autres "2 *cun*". A présent, c'est la définition de Jia Yi qui prévaut. Ce point se situe donc sur la face postérieure de la jambe, et sur une ligne reliant *Weizhong* (V40) à *Chengshan* (V57), à 2 *cun* au-dessous de *Weizhong* (V40).

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—muscle gastrocnémien—muscle plantaire grêle. Dans la couche superficielle, on trouve la veine petite saphène, le nerf cutané postérieur de la cuisse et le nerf cutané interne du mollet. Dans la couche profonde, on trouve l'artère et la veine poplitées et le nerf tibial.
- Guillaume 1995 : Petite veine saphène, artère et veine poplitées. Nerf sural, nerf tibial.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Heyang* tonifie les lombes, est utile aux Reins, relâche les tendons, vivifie les *Luo*, régularise les fonctions des méridiens *Chong mai* et *Ren mai*.
- Laurent 2000 : soulage les tendons, favorise les articulations, régularise le Foyer Inférieur, traite l'énergie du dos, régularise la sphère gynécologique.

4. Techniques de stimulation

acupuncture	moxibustion	source
Selon Tong ren, puncturer à 0,6 distance	Appliquer 5 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Needle perpendicularly 0.7-1.0 in.	Moxa stick 5-10 min., 3-5 moxa cones	Li Su Huai 1976

acupuncture	moxibustion	source
Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995
Piquer perpendiculairement à 1-2 distances	Cautériser 3-5 fois, chauffer 5-20 minutes	Roustan 1979
Piqûre perpendiculaire de 1 à 2 <i>cun</i>	Moxas : 3 à 7 ; Chauffer 20 à 30 mn	Laurent 2000
sensation de puncture		

5. Indications

Classe d'usage - point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : lombosciatique, paralysie du membre inférieur.
- Li Su Huai 1976 : lumbar/back pain, soreness and swelling of the lower leg, intestinal hemorrhage, endometritis, uterine hemorrhage, orchitis, lower abdominal spasms.
- Roustan 1979 : lombalgie, gonalgie, hémorragie utérine, douleurs herniaires.
- Guillaume 1995 : Raideur et douleur de la colonne lombaire, douleur du genou et de la jambe, contracture du mollet, douleur herniaire, méno-métrorragie, pertes blanches ; les hémorragies utérines fonctionnelles, les orchites.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Contracture du talon et du genou, douleur de la colonne lombaire qui irradie vers le ventre, sensation de chaleur de la région périnéale, douleur brutale des organes génitaux externes, accès de fièvre et de frissons avec douleur et pesanteur des genoux ». « Folie-*dian* » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Pesanteur des genoux et des fesses » (Guillaume 1995).
- Wai tai mi yao : « *Bi jue* (rhumatisme et refroidissement) », « Contractures et spasmes » (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Pesanteur et douleur des genoux et des jambes avec difficulté à la marche, hernie de type froid avec douleur unilatérale des organes génitaux externes » (Guillaume 1995).
- Bai zheng fu : « Associé à *Jiaoxin*- 8Rn, il traite l'insuffisance de *Qi* avec hémorragie par voie basse » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : raideur de la colonne lombaire avec douleur qui irradie vers l'abdomen, chaleur de la région périnéale, enflure et lassitude des jambes, difficulté à la marche, hernie de type froid avec douleur unilatérale des organes génitaux externes, méno-métrorragie et pertes blanches » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Raideur douloureuse de la colonne lombaire qui irradie vers le ventre, chaleur des genoux et des cuisses, lassitude et lourdeur des jambes, hernie-*xiu shan*, métrorragie, douleur abdominale, diarrhée, douleur des organes génitaux externes » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Raideur de la colonne lombaire qui provoque des douleurs abdominales, chaleur de la région périnéale et des fesses, lassitude et enflure des jambes, hernie de type froid-*han shan* avec descente unilatérale (hernie inguino-scrotale), méno-métrorragies » (Guillaume 1995).

- Xun jing : « Présence de toxiques dans les urines » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

indication	association	source
Hernie, méno-métrorragie, douleur abdominale, diarrhée dysentérique, douleur brutale des organes génitaux externes	55V + 6F	Qianjin (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

Études cliniques et expérimentales

6.1. Pathologies sexuelles

- Wu Jingzhong et al. Yinlian and other four effective points for sexual disorders. International Journal of Clinical Acupuncture. 1991;2(4):403-5. 84251.
There are many varieties of sex disorders in both men and women. The main disorders in men include lowered libido, frequent seminal emission, impotence, early emission, no ejaculation, retrograde ejaculation, sexual urination, oligospermia, aspermia, unliquefiable semen, small testis, infertility (including that due to testicular varicosis) and prostatic hyperplasia. Among the main disorders in women are frigidity, no orgasm, leukorrhagia, irregular menstruation, amenorrhea, dysmenorrhea, anovulation, tubal obstruction, infertility, and habitual abortion. Based on clinical observation over 30 years, the authors of this article improved their skills in point selection and treated altogether over 2000 cases with the above-mentioned problems. In recent years the total effective rate has reached nearly 80%. The points selected are Yinlian (Liv 11), Qugu (Ren 2), Ciliao (UB 32), Heyang (UB 55) Dadun (Liv 1). Following is a brief introduction to the method of point selection, needling sensation requirement, needling manipulation, treatment principles and their corresponding theoretical basis.

7. Références

From:
<http://wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:
<http://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vessie:55v>

Last update: **13 Feb 2025 15:08**